

利尻島におけるハチ類の採集記録

久松正樹¹⁾・長瀬博彦²⁾

¹⁾ 〒 306-0622 茨城県岩井市大崎 700 ミュージアムパーク茨城県自然博物館

²⁾ 〒 248-0002 神奈川県鎌倉市二階堂 81

Records of wasps in Rishiri Island, Hokkaido

Masaki HISAMATSU¹⁾ and Hirohiko NAGASE²⁾

¹⁾Ibaraki Nature Museum, 700 Osaki, Iwai-City, Ibaraki, 306-0622

²⁾81 Nikaido, Kamakura-City, Kanagawa, 248-0002

Abstract. 9 species in 4 families of wasps were collected from Rishiri Island by Hisamatsu. *Nysson maculosus* Gmelin was newly recorded from Japan.

利尻島でのハチ類の記録は、野生花バチ類(棟方・工藤, 1981) や管住性のハチ類(久松・佐藤, 2002) の報告があるが、その他まとまったレポートは少ない。1999年7月に利尻島で久松が採集したハチ類のうち整理ができたものについて、日本初記録種である *Nysson maculosus* Gmelin を含めて報告する。

種の同定については、南部敏明氏、羽田義任氏にご協力頂いた。お礼申し上げます。

Sphecidae アナバチ科

Ammophila infesta F.Smith ヤマジガバチ

1999. VII. 15, 蘭泊, 1 ♀; 1999. VII. 18, 鬼脇(鬼脇登山道), 1 ♀ 1 ♂; 1999. VII. 19, 杓形, 1 ♀.

Ammophila sabulosa nipponica Tsuneki サトジガバチ

1999. VII. 15, 杓形(森林公園), 1 ♂; 1999. VII. 18, 鬼脇(鬼脇登山道), 2 ♂; 1999. VII. 19, 杓形(森林公園), 1 ♀.

Crabronidae ギングチバチ科

Ectemnius fossorius konowii (Kohl) オオギングチ
1999. VII. 19, 杓形, 1 ♀.

Ectemnius radiatus (Pérez) ミズホギングチ
1999. VII. 19, 杓形(森林公園), 1 ♂

Ectemnius spinipes (A. Morawitz) ジョウザンギングチ
1999. VII. 19, 杓形, 1 ♂.


Ectemnius ruficornis (Zetterstedt) ヒラズギングチ
1999. VII. 19, 鬼脇(鬼脇登山道), 1 ♂.

Lestica alata (Panzer) エゾギングチ
1999. VII. 15, 神居, 2 ♀; 1999. VII. 18, 杓形, 1 ♀.

Nyssonidae ドロバチモドキ科

Gorytes laticinctus koreanus Handlirsch コウライアワフキバチ
1999. VII. 19, 杓形, 3 ♂.

Nysson maculosus Gmelin アカオビドロバチモドキ
1999. VII. 18, 鬼脇(鬼脇登山道), 1 ♀.
第2腹面節基部は側面から見て丸い。Occipital



Figs. 1. *Ammophila infesta* F. Smith, 2. *Ectemnius fossorius konowii* (Kohl), 3. *Ectemnius ruficornis* (Zetterstedt), 4. *Gorytes laticinctus koreanus* Handlirsch, 5. *Nysson maculosus* Gmelin.

carina は下端まで明瞭で稜状。前伸腹節上側部の毛はややまばらで体表の彫刻が見える。触覚は全体黒い。頭楯前縁は中央が突出する。中胸背は二重に点刻される。つまり大点刻の間に非常に小さい点刻がある。前胸のカラーの上面、肩コブ、小楯板の斑紋は黄色。♀の最終腹面節に光沢のある稜はない。♂の触覚の末端節は強

く屈曲する。ハバロフスク、アムール、沿海州、樺太、ヤクート、チタ、イルクーツク、アルタイ、カザフ、ソ連の欧州部分、朝鮮半島、北・東北中国、欧州に分布する (Lehr. 1995)。なお、本種は常木 (1965) にアカオビドロバチモドキ *N. maculatus* (Fab.) として記載されているので、和名はそれを採用した。

Philanthidae フシダカバチ科

Cerceris hortivaga Kohl ナミツチスガリ

1999. VII. 18, 沼浦 (オタトマリ沼), 1 ♀ 5 ♂;

1999. VII. 18, 鬼脇 (鬼脇登山道), 11 ♂.

文献

久松正樹・佐藤雅彦. 2002. 利尻島の管住性ハチ類.
利尻研究, (21): 45-48.

Lehr. P. A.(ed.). 1995. Key to the insects of
Russian Far East in six volumes. Vol. IV.
Neuropteroidea, Mecoptera, Hymenoptera.
Part 1. 606pp., Nauka.

棟方明陽・工藤光信. 1981. 利尻島における野生ハ
ナバチの調査. 生物教材, (16): 122-130.

常木勝二. 1965. 蜂類研究手引 (22) (10) ドロバチ
モドキ亜科 (Nyssoninae), I. 生物研究 IX, 1・2:
24-33.